

INSTRUCCIONES PARA SOLUCIÓN NULYTELY
Instructions for Nulytely Split Dose Prep

Compre en la farmacia o tienda:

- Tres tabletas de 5mg de Bisacodyl (Dulcolax)

Usted necesitará:

- Receta para Nulytely _____ entregada _____ llamada a la farmacia

Instrucciones especiales:

- A.** No tome las siguientes medicinas siete 7 días antes de su procedimiento.
1. Medicinas con hierro.
 2. Píldoras que contengan aceites como aceite de pescado, vitamina E o aceite de castor, (si usted ha tomado estas medicinas, por favor no siga y avísele a su doctor el día de su procedimiento)
- B.** Por favor avísenos si usted es diabético o usa medicinas para adelgazar la sangre. Su medicina necesitará ser ajustada durante el tiempo de la preparación y del procedimiento.
- C.** 3 días antes de la preparación – No consuma frutas con cáscara, vegetales crudos, nueces, semillas, maíz o palomitas de maíz. No consuma fibras tales como Metamucil o Citrucel. Si por accidente comió cualquier cosa que no debería haber comido, continúe con la preparación tal como se le indica y evite volver a comer los alimentos que se indican en esta lista

Un día antes de la prueba:

1. Haga dieta de líquidos claros todo el día.

Dieta líquida:

Tome **SOLAMENTE** líquidos claros todo el día (desayuno, almuerzo y cena) Por ejemplo: té, café, agua, jugo de manzana jugo de arándanos (cranberry) (no contiene colorantes rojos), caldos, bebidas carbonatadas, helados de hielo, gelatina, Hi-C, Gatorade, Crystal Light. **No tome líquidos rojos** (puede tomar jugo de arándano) (cranberry). No comida sólida o productos lácteos.

2. En la mañana, llene la botella de Nulytely con agua (puede ser agua destilada, agua embotellada o agua potable). Puede agregar 02 bolsitas de limonada Crystal Light a la mezcla de Nulytely de sabor regular. Mézclelo bien y manténgalo en refrigeración.

***4:00 PM.** Tome las 03 tabletas Dulcolax juntas.

***5:00 PM.** Puede empezar a tomar la mezcla de Nulytely. Tome 01 vaso (06 a 08 onzas) cada 15-30 minutos hasta terminarse ½ galón. Si siente náusea, haga una pausa de hasta una hora. Asegúrese de estar cerca de un baño.

Día del procedimiento:

***5 horas antes de su hora de llegada** – Tómese el otro ½ galón de Nulytely, no tome ningún otro líquido. Asegúrese de terminarse el galón de mezcla de Nulytely por completo dentro de las próximas 2 horas. No deberá tomar ningún líquido 3 horas antes su hora de llegada.

**Deberá tener un chofer que le lleve a casa luego de su procedimiento
o su procedimiento puede ser cancelado.**

Por favor llame a la oficina al 397-7340 si tiene preguntas.

Después de las 5:00 de la tarde marque 490-5704.

_____ llegará a las _____

Mi procedimiento está programado para _____ . Mi hora de llegada es _____ .